

Correction DM 2 LM 121 PCME 14.2

1.
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & 3 & 0 \\ v & -1 & -1 \\ w & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - v + w & 5 & 3 \\ 2u + v + 3w & 8 & 5 \\ u - v + 2w & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$
 De sorte qu'on

se ramène à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} u - v + w = -3 \\ 2u + v + 3w = -2 \\ u - v + 2w = -5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \begin{cases} u - v + w = -3 \\ 3v + w = 4 \\ w = -2 \end{cases}$$

On peut alors résoudre un tel système triangulaire :

$w = -2$. D'où en remplaçant w par sa valeur dans L_2 : $3v + (-2) = 4$ donc $v = 2$, puis en remplaçant v et w par leurs valeurs dans L_1 : $u - 2 + (-2) = -3$ donc $u = 1$. Donc il y a une unique solution qui est $(u, v, w) = (1, 2, -2)$.

2. (a) $\text{Det}(A) = -9$.

(b) On sait que A est inversible si et seulement si $\text{Det}(A) \neq 0$, ainsi A est inversible. On calcule A^{-1} par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right. \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}]{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -5 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right. \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & -6 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right. \xrightarrow[\substack{L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2}]{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{pmatrix} \right. \xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{L_3}{9}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \\ \frac{7}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \right. \xrightarrow[\substack{L_1 \leftarrow L_1 + 3L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + 5L_3}]{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{-2}{3} \\ \frac{7}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \right.$$

$$\text{Ainsi } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{-2}{3} \\ \frac{7}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Pour être bien sûr, on vérifie que $\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 \\ \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) En écriture matricielle, ce système équivaut à :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

En multipliant à gauche par A^{-1} on obtient :

$$A^{-1}A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 \\ \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il y a ainsi une unique solution $(x, y, z) = (3, 2, 1)$.

3.

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = 0 \\ 2x & -y & +z & = 4 \\ 3x & +y & +2z & = 4 \\ 5x & & +3z & = 8 \end{cases} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 5L_1}} \begin{cases} x & +2y & +z & = 0 \\ & -5y & -z & = 4 \\ & -5y & -z & = 4 \\ & -10y & -2z & = 8 \end{cases}$$

On supprime L_3 qui est équivalent à L_2 , de même que $L_4 = 2L_2$. Le système équivaut donc à :

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = 0 \\ & -5y & -z & = 4 \end{cases}$$

On reconnaît une droite paramétrisée par $t = y$:

$z = -4 - 5t$ et donc $x = -z - 2y = -(-4 - 5t) - 2t = 4 + 3t$. Les solutions sont donc une droite paramétrisée ainsi :

$$\begin{cases} x & = & 4 + 3t \\ y & = & t \\ z & = & -4 - 5t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. (a) On se convainc, en calculant $M^2, M^3, M^4 \dots$, que M^n est de la forme $\begin{pmatrix} 3^n & u_n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. On aurait alors $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} 3^n & u_n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -30 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{n+1} & -30 \cdot 3^n + 2u_n \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix}$ d'où la relation : $u_{n+1} = 2u_n - 30 \cdot 3^n \forall n \geq 0$, et $u_1 = -30$. Donc également $u_n = 2u_{n-1} - 30 \cdot 3^{n-1}$, qui donne $u_{n+1} = -30(3^n + 2 \cdot 3^{n-1}) + 2^2 u_{n-1}$. En continuant encore une étape, on obtient $u_{n+1} = -30(3^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 2^2 \cdot 3^{n-2}) + 2^3 u_{n-2}$. On peut

alors avoir l'intuition que $u_{n+1} = -30(3^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 2^2 \cdot 3^{n-2} + \dots + 2^{n-1} \cdot 3) + 2^n u_1 = -30(3^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 2^2 \cdot 3^{n-2} + \dots + 2^{n-1} \cdot 3) - 30 \cdot 2^n = 30(3^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 2^2 \cdot 3^{n-2} + \dots + 2^{n-1} \cdot 3 + 2^n) = -30 \left(\sum_{k=0}^n 3^{n-k} 2^k \right) = -30 \cdot 3^n \left(\sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3} \right)^k \right) = -30 \cdot 3^n \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \right) = -30 \cdot \frac{3^{n+1}}{3} \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \right) = -30 \left(\frac{3^{n+1} - 2^{n+1}}{3 - 2} \right) = -30(3^{n+1} - 2^{n+1}) = u_{n+1}$. De sorte qu'on aurait $u_n = -30(3^n - 2^n)$ et donc

$$M^n = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Maintenant que l'on pense avoir trouvé la bonne formule, essayons de montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $M^n = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$

*Initialisation : pour $n = 1$ le résultat est vrai , en partie car pour $n = 1$, $-30(3^n - 2^n) = -30$.

*Hérédité : soit $n \geq 1$ et supposons que $M^n = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

$$\text{Alors } M^{n+1} = M^n \cdot M = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -30 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{n+1} & -30 \cdot 3^n - 2 \cdot 30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Le coefficient en haut à droite vaut $-30(3^n + 2 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n) = -30(3^{n+1} - 2^{n+1})$. Ce qui achève la récurrence. On a donc prouvé que pour tout

$$n \geq 1 \quad M^n = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

(b) $M \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -30 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3p_n - 30r_n \\ 2r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix}$ Un récurrence facile montrerait alors que pour tout $n \geq 0$, $\begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} =$

$$M^n \begin{pmatrix} p_0 \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & -30(3^n - 2^n) \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 59 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 59 \cdot 3^n - 2 \cdot 30(3^n - 2^n) \\ 2^n \end{pmatrix}.$$

Ainsi $p_n = 59 \cdot 3^n - 60 \cdot 3^n + 60 \cdot 2^n = 60 \cdot 2^n - 3^n$. On sait alors que $60 \cdot 2^n - 3^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$, car *le 3^n va l'emporter devant le 2^n* . On

peut essayer plusieurs valeurs et se rendre compte par exemple que $p_{15} = -12382827$, donc la réponse est oui , à partir d'un moment, les renards auront mangé toutes les poules. Précisément, on peut se rendre compte que c'est au temps $n = 11$ que cela arrive, au sens où $p_{10} = 2391$ (il y a à ce moment là $r_{10} = 1024$ renards) et il faudrait que $3p_{10} > 30r_{10}$ pour que les poules survivent ce qui n'est pas le cas, et $p_{11} = -54267$.